

B I J D R A G E
TOT DE KENNIS DER
ICHTHYOLOGISCHE FAUNA
VAN
S O L O R.
DOOR
Dr. P. BLEEKER.

In een paar korte berichten, opgenomen in den 2ⁿ en 3ⁿ jaargang van het Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, maakte ik melding van een tiental vischsoorten van Solor, mij geworden door de welwillendheid van de heeren M. TH. REICHE en VAN STOCKUM. Deze soorten, de eerste welke van Solor zijn bekend geworden, waren *Serranus marginalis* CV., *Caesio coerulaureus* Lacép., *Chaetodon vittatus* Bl. Schn., *Chaetodon unimaculatus* Bl., *Chaetodon virescens* CV., *Acanthurus scopas* CV., *Glyphisodon melas* K. v. H., *Balistes conspicillum* Bl. Schn., *Ostracion cornutus* L. en *Ostracion rhinorhynchos* Blkr.

De heer J. C. J. HELLMUTH, officier van gezondheid 2^e kl., heeft, gedurende een verblijf van eenige weken te Lawajong, op de noordkust van het eiland Solor, de goedheid gehad, talrijke

vischsoorten te verzamelen, welke in een' uitmuntend goeden toestand van bewaring mij zijn geworden. Deze verzameling, voor welker welwillende aanbieding ik den heer HELLMUTH hier openlijk mijnen dank betuig, bestaat uit 66 soorten, waarvan slechts eene enkele; *Chaetodon virescens* CV., mij reeds van Solor bekend was.

Ik ben hierdoor in staat gesteld de kennis der vischfauna van Solor een aanmerkelijke schrede voorwaarts en de van daar bekende vischsoorten van 10 te brengen op de hieronder genoemde 75.

1. *Apogon cyanosoma* Blkr.
2. " *cyanotaenia* Blkr.
3. " *roseipinnis* CV. Nat. Tijdschr. N. Ind. III p. 253.
4. *Cheilodipterus quinquelleatus* CV. ibid. III p. 253.
5. *Serranus alboguttatus* CV?
6. " *marginalis* CV. Verh. Bat. Gen. XXII Percoid.
7. " *cyanostigmatoïdes* Blkr. ibid.
8. *Therapon theraps* CV. ibid.
9. *Holocentrum orientale* CV. ibid.
10. *Pterois antennata* CV.
11. " *brachypterus* CV. Nat. T. N. Ind. III p. 265.
12. *Diagramma polytaenia* Blkr. ibid. III p. 755.
13. *Scolopsides lineatus* QG?
14. *Heterognathodon Hellmuthii* Blkr.
15. *Caesio coeruleaureus* Lacép. Verh. B. Gen. XXIII Spar. Maen.
16. *Chaetodon vittatus* Bl. Schn. Verh. Bat. Gen. XXIII Chaetod.
17. " *virescens* CV. ibid.
18. " *unimaculatus* Bl. Nat. T. N. Ind. II p. 241.
19. " *selene* Blkr.
20. *Heniochus macrolepidotus* CV. Verh. B. Gen. XXIII Chaet.
21. *Holacanthus bicolor* Bl. *
22. " *melanosoma* Blkr.
23. " *leucopleura* Blkr.
24. *Platax Blochii* CV. Verh. B. Gen. XXIII Chaet.
25. *Pimelepterus altipinnis* CV. Nat. T. N. Ind. III p. 727.
26. *Seriola tapeinometopon* Blkr.
27. *Acanthurus scopas* CV. Nat. T. N. Ind. II p. 348.
28. *Petroskirtes solorensis* Blkr.
29. *Opistognathus solorensis* Blkr.

30. *Gobius nox* Blkr. Nat. T. N. Ind. I p. 248.
31. " *quinquestrigatus* CV.
32. *Antennarius raninus* Cant. Nat. T. N. Ind. III p. 707.
33. " *nesogallicus* CV.
34. " *horridus* Blkr.
35. *Plesiops coeruleolineatus* Rüpp. Nat. T. N. Ind. IV p. 116.
36. *Premnas trifasciatus* CV.
37. *Amphiprion chrysargurus* Richards. (sub. nom. *Amph. xanthurus* in Nat. T. N. Ind. III p. 560).
38. *Pomacentrus littoralis* K. v. H. ibid. IV p. 483.
39. " *pavoninus* Blkr.
40. " *moluccensis* Blkr. Nat. T. N. Ind. IV p. 118.
41. *Dascyllus aruanus* CV. ibid. II p. 246.
42. *Glyphisodon melas* K. v. H. Verh. Bat. Gen. XXI Labr. Ctenoid.
43. *Julis (Julis) lunaris* CV. ibid. XXII Gladsch. Labroïd.
44. " (*Halichoeres*) *elegans* K. v. H. Nat. T. N. Ind. III p. 289.
45. " (" *melanurus* Blkr. ibid. II p. 251.
46. " (" *Hoevenii* Blkr. ibid. II p. 250.
47. " (" *miniatus* K. v. H. ibid. III p. 171.
48. " (" *interruptus* Blkr. II p. 252.
49. " (" *solorensis* Blkr.
50. *Cirrhilabrus solorensis* Blkr.
51. *Cheilinus ceramensis* Blkr. Nat. T. N. Ind. III p. 290.
52. *Belone cylindrica* Blkr. Verh. Bat. Gen. XXIV Snoek.
53. *Hemiramphus fasciatus* Blkr.
54. *Saurida nebulosa* CV. Nat. N. Ind. III p. 292.
55. *Synaptura marmorata* Blkr.
56. *Tetraodon meleagris* Soland.
57. " *laterna* Richards. Nat. T. N. Ind. III p. 299.
58. " *papua* Blkr. Verh. Bat. Gen. XXIV Blootk. vissch.
59. " *margaritatus* Rüpp. Nat. T. N. Ind. III p. 302.
60. " *Valentini* Blkr. ibid. IV p. 130.
61. *Diodon orbicularis* Bl.
62. *Balistes aculeatus* Bl. Schn. Verh. Bat. Gen. XXIV Balist.
63. " *praslinus* Lacép. ibid.
64. " *lineatus* Bl. Schn. ibid. Nat. T. N. Ind. II p. 260.
65. " *armatus* Lacép. ibid. II p. 224.
66. " *conspicillum* Bl. Schn. ibid. III p. 780.
67. " *chrysospilos* Blkr.
68. " *senticosus* Richards.
69. *Monacanthus melanocephalus* Blkr.
70. *Alutarius laevis* Cuv. Nat. T. N. Ind. III p. 304.

71. *Ostracion tesserula* Cant. *ibid.* III p. 305.
72. " *cornutus* L. Verh. Bat. Gen. XXIV Balist. *Ostrac.*
73. " *solorensis* Blkr.
74. " *rhinorhynchos* Blkr. Verh. Bat. Gen. XXIV Balist. *Ostrac.*
75. *Solegnathus Blochii* Blkr. = *Syngnathoides Blochii* Blkr. Nat. T. N. Ind. II p. 259.

Van deze soorten zijn nieuw voor mijne verzameling niet minder dan 25, waaronder 20 tevens nieuw voor de kennis van den Indischen Archipel en 18 nieuw voor de wetenschap. Deze nieuwe soorten zijn: *Apogon cyanosoma*, *Apogon cyano-taenia*, *Heterognathodon Hellmuthii*, *Chaetodon selene*, *Holacanthus melanosoma*, *Holacanthus leucopleura*, *Seriola tapeinometopon*, *Petroskirtes solorensis*, *Opistognathus solorensis*, *Antennarius horridus*, *Pomacentrus pavoninus*, *Julis (Halichoeres) solorensis*, *Cirrhitabrus solorensis*, *Hemiramphus fasciatus*, *Synaptura marmorata*, *Balistes chrysospilos*, *Monacanthus melanoccephalus* en *Ostracion solorensis*.

Het naast bij Solor gelegene eiland omtrent welks vischfauna in de wetenschap iets is bekend geworden is Timor. Over de visschen van Timor heb ik in den derden jaargang van het Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsche Indië eene kleine bijdrage bekend gemaakt, waarin ik het toen bekende aantal Timorsche vischsoorten bragt van 32 op 57. Van die Timorsche soorten zijn tot nog toe slechts bij Solor gevonden *Chaetodon virescens* CV., *Plesiops coeruleolineatus* Rüpp. (*Plesiops melas* Blkr. olim), *Dascyllus aruanus* CV., *Julis (Halichoeres) interruptus* Blkr., *Julis (Halichoeres) miniatus* K. v. H. en *Saurida nebulosa* CV., dus slechts 6, zoodat van Solor en Timor te zamen thans bekend zijn 126 soorten.

Van beide eilanden is de kennis ten dezen opzigte dus voor alsnog gering te noemen.

DESCRIPTIONES SPECIERUM DIAGNOSTICAE.

PERCOÏDEI.

Apogon cyanotaenia Blkr.

Apog. corpore oblongo compresso, altitudine $3\frac{1}{2}$ circiter in ejus longitudine, latitudine $1\frac{3}{4}$ circiter in ejus altitudine; capite $3\frac{1}{2}$ circiter in longitudine corporis, longiore quam alto; oculis diametro $2\frac{1}{4}$ circiter in longitudine capitum; orbitis glabris; linea rostro-frontali convexiuscula; maxilla superiore inferiore paulo longiore sub oculi dimidio posteriore desinente; praecoperculo rotundato margine posteriore et inferiore denticulato, crista intramarginali edentula; suboperculo interoperculoque edentulis; squamis lateribus 25 p. m. in serie longitudinali, 8 vel 9 in serie transversali; linea laterali subarborescente; dorso ventre multo altiore; pinna dorsali spinosa dorsali radiosa humiliore, spina 3^a spinis ceteris longiore; dorsali radiosa et anali acutiusculis, dorsali anali altiore corpore paulo humiliore; pectoralibus obtusis et ventralibus acutiusculis $5\frac{1}{2}$, caudali emarginata lobis obtusis rotundatis 5 circiter in longitudine corporis; colore corpore roseo; capite vittis longitudinalibus coeruleis; dorso vittis 4 vel 5 gracilibus longitudinalibus fuscis; lateribus superne fasciis 2 longitudinalibus aurantiacis; pinnis rubris, caudali basi macula rotunda nigra.

B. 7. D. 7 — 1/9 vel 7 — 1/10. P. 2/12. V. 1/5. A. 2/8 vel 2/9. C. 17 et lat. brev.

Habit. Lawajong, in mari.

Longitudo speciminis unici 88'''.

Aanm. *Apogon cyanotaenia* laat zich gemakkelijk herkennen aan de blaauwe strepen over den kop, smalle overlangsche bruine rugbandjes, bruine staartvinvlek, spitse rug- en aarsvinnen enz.

Apogon cyanosoma Blkr.

Apog. corpore oblongo compresso, altitudine $3\frac{1}{2}$ circiter in ejus longitudine, latitudine 2 fere in ejus altitudine; capite $3\frac{1}{2}$ circiter in longitudi-

dine corporis, longiore quam alto: oculis diametro $2\frac{1}{2}$ fere in longitudine capitidis; orbitis glabris; linea rostro-frontali declivi rectiuscula; maxilla superiore inferiore breviore sub oculi dimidio posteriore desinente; praaeperculo rotundato margine posteriore et inferiore denticulato, crista intramarginali edentula; suboperculo interoperculoque edentulis; squamis lateribus 23 p. m. in serie longitudinali, 8 p. m. in serie transversali; linea laterali subarborescente; dorso ventre multo altiore; pinna dorsali spinosa dorsali radiosae humiliore spina 3^a spinis ceteris longiore; dorsali radiosae et anali acutis emarginatis, dorsali anali altiore corpore humiliore; pectoralibus obtusis et ventralibus acutis $5\frac{1}{2}$, caudali leviter emarginata angulis acutiusecula $4\frac{1}{2}$ circiter in longitudine corporis; colore corpore pulchre coeruleo fasciis 6 longitudinalibus aureis; pinnis rubris.

B. 7. D. 7 — 1/9 vel 7 — 1/10. P. 2/13. V. 1/5. A. 2/8 vel 2/9. C. 17 et lat. brev.

Habit. Lawajong, in mari.

Longitudo speciminis unici 54'''.

Aanm. Deze fraaije soort is gemakkelijk herkenbaar aan haar fraai blaauw met zes overlangsche goudkleurige banden geteekend ligchaam, vooruitstekende onderkaak, uitgerande rug-en aarsvinnen enz.

SCLEROPAREI.

Pteroës antennata CV. Poiss. IV p. 265.

Pter. corpore oblongo compresso, altitudine $3\frac{1}{2}$ circiter in ejus longitudine, latitudine $1\frac{1}{2}$ circiter in ejus altitudine; capite $3\frac{2}{3}$ circiter in longitudine corporis; oculis diametro $3\frac{1}{4}$ ad $3\frac{1}{2}$ in longitudine capitidis, diametro $\frac{3}{4}$ circiter distantibus; vertice postice et antice, temporibus, orbita rostroque spinis vel spinulis armatis; spinulis orbitalibus pluribus; cirris vel fimbriis supraorbitalibus oculo multo longioribus ramosis, nasalibus, rostralibus et praaepercularibus oculo brevioribus; ossibus suborbitalibus crista spinosa oculo valde approximata; praaeperculo rotundato spinis 2 vel 3 acutis; operculo spina unica plana obtusa; squamis lateribus 50 p. m. in serie longitudinali; pinna dorsali spinosa corpore altiore spinis 7^a, 8^a et 9^a spinis ceteris longioribus, spinis membrana parte inferiore tantum unitis; dorsali radiosae et anali angulatis angulo rotundatis corpore humilioribus; pectoralibus caudalem attингentibus vel superantibus; ventralibus analem attингentibus; caudali rotundata 4 circiter in longitudine corporis; colore corpore rosco inferne

dilutiore; rostro genisque maculis fuscis; fasciis corpore fuscis transversis p. m. 13, fascia 1^a oculari, 2^a postoculari, 3^a operculari, 4^a dorso-operculari, 5^a dorso-pectorali; fasciis corpore fasciis aurantiaco-fuscis gracilio-ribus alternantibus; cirris supraorbitalibus roseo et nigro annulatis, pra-opercularibus rubro-violaceis; macula supraäxillari lutea; pinnis verticalibus membrana roseis spinis radiisque roseo-aurantiaco et fusco annulatis; pectoralibus radiis superioribus pulchre rubro-violaceis radiis inferioribus roseis, membrana basi rosea fasciis 2 transversis fuscis, partem liberam versus violacea, medio pinnae superiore maculis rotundis nigris; ventralibus radiis rubro-violaceis membrana fusco-violacea, basi vittis 2 vel 1 obliquis roseis.

B. 7. D. 12/11 vel 12/12. P. 16 vel 17 (omn. simpl.). V. 1/5. A. 3/6 vel 3/7 C. 14 et lat. brev.

Synon. *Scorpaena antennata* Bl. Aml. Fisch. tab. 185.

Fühlhornträger Bl. ibid.

. *Scorpène à antennes* Bl. ibid.

Pteroïs antenné CV. Poiss. IV p. 265.

Habit. Lawajong, in mari.

Longitudo 2 speciminum 130''' et 161'''.

Aanm. Na verwant aan *Pteroïs volitans* CV., is *Pteroïs antennata* CV. daarvan echter gemakkelijk te onderkennen aan spitser profiel, andere kleurtekening van ligchaam en gepaarde vinnen, aan de plaatsing der suborbitaaldoornkam zeer digt bij het oog, het onverdeeld zijn van alle borstvinstralen enz.

SCIAENOÏDEI.

Scolopsides lineatus QG. Zoöl. Voy. Freycin. tab. 60 fig. 3?

Scolopsid. corpore oblongo compresso, altitudine $3\frac{1}{2}$ circiter in ejus longitudine, latitudine 2 et paulo in ejus altitudine; capite $4\frac{1}{4}$ circiter in longitudine corporis, longiore quam alto; linea rostro-dorsali fronte convexa nucha concava; fronte inter oculos squamosa; oculis diametro $2\frac{1}{2}$ circiter in longitudine capitidis; osse suborbitali sub oculo oculi diametro plus triplo humiliore, postice spina valida gracili, infra spinam dentibus 2 ad 4 parvis; osse supramaxillari glabro; rostro oculo breviore; praoperculo obtusangulo, margine posteriore vix emarginato dentibus valde conspicuis; squamis lateribus ciliatis 35 p. m. in serie longitudinali; pinna dorsali spinis mediocribus spinis mediis spinis ceteris longioribus corpore minus triplo humilioribus, parte radiosa parte spinosa paulo altiore ob-

tusa rotundata; pinnis pectoralibus acutis et ventralibus post basin pectoralium insertis acutis radio 1° producto $4\frac{1}{2}$ circiter, caudali emarginata lobis acutis superiore paulo longiore $4\frac{1}{2}$ ad $4\frac{1}{4}$ in longitudine corporis; anali spina media spina 1° et 3° multo longiore et crassiore, parte radio-sa spina 2° paulo humiliore rotundata; colore corpore superne violaceo-nigro, mediis lateribus violaceo, inferne margaritaceo vel dilute roseo; vitta interoculari flava; nigro dorso guttis coeruleis et vittis 3 longitudinalibus flavis, vittis 2 superioribus fronto-dorsalibus vitta 1° impari ante dorsalem radiosam desinente, 2° dimidium dorsalis radiosae posterius attingente, 3° oculo-dorsali radium dorsalem posticum attingente; fascia in-super longitudinali margaritacea rostro-infraoculo-caudali basin pinnae caudalis superiorem attingente; pinna dorsali spinosa flava antice macula nigra; dorsali radiosa hyalino-rosea antice superne fusca; pectoralibus et ventralibus flavis; anali dimidio anteriore nigra dimidio posteriore dilute rosea; caudali fuscescente-aurantiaca.

B. 5. D. 10/9 vel 10/10. P. 2/15. V. 1/5. A. 3/7 vel 3/8. C. 17 et lat. brev.

Synon. *Scolopsides cancellatus* CV. Poiss. V p. 264, ex parte.

Habit. Lawajong, in mari.

Longitudo speciminis unici 104'''.

Aanm. Het komt mij voor, dat onder den naam van *Scolopsides cancellatus* CV. in de groote Histoire naturelle des Poissons twee soorten beschreven zijn, en wel de soort, welke ik onder denzelfden naam beschreef in de Bijdrage tot de kennis der Sciaenoïden van den Indischen Archipel (Verh. Bat. Gen. XXIII) en de bovenbeschrevene, welke ik vermoed dezelfde te zijn als *Scolopsides lineatus* QG., doch hetwelk ik niet kan beslissen, omdat de afbeelding van laatstgenoemde soort niet ter mijner beschikking is. Zoo ook vermoed ik, dat het specimen door DE MERTENS bij Ulea gevonden en in het groote vischwerk (V p. 265) vermeld, evenzeer tot *Scolopsides lineatus* te brengen is.

Mijne specimina van *Scolopsides cancellatus* onderscheiden zich standvastig van het boven beschrevene door stomper en boller profiel, door het sterker getand zijn en meer hoekige van het onderoogkuilsbeen, door sterker uitgerand preoperkel, door groenachtige kleur van den rug, door het afgebroken zijn van

den oog-rugband beneden de zijlijn onder het achterste gedeelte der doornachtige rugvin, door groote lichtgroene vlekken op het achterste gedeelte van den rug, door afwezigheid van den parelkleurigen snuit-staartband, van de zwarte vlek voor aan de rugvin, door roosachtig-paarskleurige vlek voor op de aarsvin enz.

Heterognathodon Hellmuthii Blkr.

Heterogn. corpore oblongo compresso, altitudine $4\frac{1}{4}$ circiter in ejus longitudine, latitudine 2 fere in ejus altitudine; capite acuto $4\frac{2}{3}$ circiter in longitudine corporis; altitudine capitinis $1\frac{1}{3}$ circiter in ejus longitudine; linea rostro-frontali declivi convexa; oculis diametro 3 et paulo in longitudine capitinis; rostro convexo oculo breviore; osse suborbitali squamoso, angulo oris oculi diametro plus duplo humiliore; maxilla superiore mediocriter protractili, ore clauso maxilla inferiore vix longiore, paulo ante oculum desinente; dentibus maxillis pluriseriatis paryis serie externa paulo majoribus, maxilla inferiore antice insuper dentibus 12 dentibus ceteris longioribus curvatis, maxilla superiore antice caninoideis 6 curvatis; praeoperculo subrectangulo angulo rotundato, ubique squamoso, margine posteriore denticulis minimis serrato; operculo spina unica plana; linea dorsali linea ventrali convextiore; squamis ciliatis, lateribus 50 p.m. in serie longitudinali; squamis inguinibus interventralibusque acutis elongatis; pinna dorsali spinis gracilibus mediis ceteris longioribus, parte radiosa postice rotundata; pectoralibus obtusis $5\frac{1}{4}$, ventralibus acutis radio 1o paulo producto $5\frac{1}{3}$ circiter, caudali semilunariter emarginata lobis acutis superiore paulo longiore $4\frac{1}{4}$ circiter in longitudine corporis; anali postice angulata; colore corpore superne umbrino, inferne roseo vel margaritaceo; fascia oculo-caudali diffusa fusca aurantiaco limbata; punetis coeruleis lineae laterali maxime approximatis in series 2 supra et infra lineam lateralem dispositis; rostro aurantiaco; pinuis roseis, dorsali aurantiaco marginata, caudali marginibus superiore et inferiore profundiore.

B. 6. D. 10/9 vel 10/10. P. 2/13. V. 1/5. A. 3/7 vel 3/8. C. 17 et lat. brev.

Habit. Lawajong, in mari.

Longitudo speciminis unici 115''.

Aann. Tot nu toe zijn mij 6 soorten van *Heterognathodon*, alle van den Indischen Archipel, bekend geworden, t. w. *Heterognathodon xanthopleura* Blkr., *H. macrurus* Blkr., *H. ne-*

murus Blkr., *H. microdon* Blkr., *H. bifasciatus* Blkr. en de bovenbeschrevene. Deze laatste is herkenbaar aan haar slank ligchaam, kleine hondstanden, geheel beschubten snuit, het niet verlengd zijn der staartvinkwabben en eigenaardige kleurtekening.

CHAETODONTOÏDEI.

Chaetodon selene Blkr.

Chaet. corpore disciformi, diametro dorso-ventrali 2 et paulo in longitudine corporis; capite $3\frac{2}{3}$ ad $3\frac{3}{4}$ in longitudine corporis; oculis diametro 3 ad $3\frac{1}{2}$ in longitudine capitidis; linea rostro-dorsali capite concava nucha declivi rectiuscula linea rostro-ventrali vix longiore; rostro acuto squamoso; praoperculo angulo denticulato; squamis lateribus 28 p. m. in serie longitudinali; pinnis dorsali et anali obtusis rotundatis, dorsali spinosa spinis 4^a, 5^a, 6^a et 7^a spinis ceteris crassioribus et longioribus; pectoralibus acutiusculis $4\frac{1}{2}$ ad 5 fere, ventralibus acutis $4\frac{2}{3}$ ad $5\frac{1}{2}$, caudali extensa convexa 5 et paulo ad $5\frac{2}{3}$ in longitudine corporis; colore corpore margaritaceo-flavo; vittis rostro-oculari et interocularibus flavis; fascia oculari oculi diametro graciliore a spina dorsi 1^a descendente superne obliqua fuscescente-nigra infra oculum fuscescente-aurantiaca flavo limbata; pinnis pectoralibus flavis, ventralibus albidis, ceteris aurantiacis; dorsali basi fascia lata nigricante-fusca postice usque ad medianam basin pinnae analis radiosae descendente; squamis dorso singulis gutta aurantiaca; lateribus vittis obliquis aurantiacis pinnam dorsalem radiosam versus adscendentibus; pinnis dorsali et anali radiosis infra marginem vittula duplice coerulea et violacea; pinna caudali dimidio posteriore violacea.

B. 6. D. 12/22 vel 12/23. P. 2/12 vel 2/13. V. 1/5. A. 3/18 vel 3/19 vel 3/20. C. 17 et lat. brev.

Synon. *Spitsbeck*, *Bec pointu* Ren. Poiss. Mol. II tab. 29 fig. 84.

Habit. Lawajong, in mari.

Longitudo 4 speciminum 85''' ad 122'''.

Aanm. Deze Chaetodon is na verwant aan *Chaetodon lunatus* en heeft een' dergelijken zwarten band, die langs de basis der rugvin gaat en over den staart dalende ongeveer het midden der basis van de straalachtige aarsvin bereikt. Evenwel zijn bij *Chaetodon lunatus* de schubben veel minder talrijk,

is de oogband regtstandig en veel breeder dan het oog, zijn de zijden met violet dwars en niet schuins gestreept, heeft de staartvin aan den achterrand twee dwarsche zwarte strepen, hebben de rug- en aarsvin talrijker stralen enz.

Holacanthus bicolor CV. Poiss. VII p. 126.

Holacanth. corpore oblongo compresso, diametro dorso-ventrali $2\frac{1}{3}$ circiter in longitudine corporis; capite obtuso 5 et paulo in longitudine corporis; linea rostro-frontali valde declivi rectiuscula; linea rostro-dorsali linea rostro-ventrali breviore; oculis diametro $3\frac{1}{2}$ circiter in longitudine capitis; osse suborbitali oculi diametrum altitudine aequante, inferne denticulis 8 p. m. bene conspicuis armato; praaeperculo margine posteriore dentibus acutis 20—30 conspicuis serrato, margine inferiore dentibus 2 vel 3 magnis, spina capite duplo vel minus duplo breviore; suboperculo et interoperculo denticulatis; squamis lateribus 47 p. m. in serie longitudinale; pinna dorsali spinosa spina postica spinis ceteris longiore, parte radiosa angulata acuta radiis longissimis $1\frac{1}{2}$ ad $1\frac{2}{3}$ in altitudine corporis; pectoralibus obtusis 5, ventralibus acutis radio 1° producto $4\frac{1}{2}$ ad $4\frac{2}{3}$, caudali obtusa rotundata $4\frac{2}{3}$ circiter in longitudine corporis; anali acuta angulata altitudine dorsali radiosae aequali vel subaequali; colore corpore et pinna dorsali usque ad spinam dorsalem 6^m vel 7^m et paulo post basin pinnae ventralis pulcherrime flavo; fascia oculari genis fusca diffusa vertice nigra cum fascia lateris oppositi unita; corpore postice pinnisque dorsali post spinam 7^m et tota pinna anali nigris singulis squamis basi vitta transversa coerulea; nigro corpore flavo dilutiore limbato; pinna dorsali margine superiore flava; cauda postice, pinnisque caudali, pectoralibus ventralibusque pulchre flavis.

B. 6. D. 15/16 vel 15/17. P. 2/14. V. 1/5. A. 3/18 vel 3/19. C. 17
et lat. brev.

Synon. *Pangerang* De Vlaming.

Color sousounam Renard Poiss. Mol. I tab. 19, fig. 106.

Chaetodon bicolor Bl. Ausl. Fisch. tab. 206 fig. 1.

Zweifarbigie Klippfisch Bl. ibid.

Griselle Bl. ibid.

Holacanthe bicolor CV. Poiss. VII p. 126.

Habit. Lawajong, in mari.

Longitudo 2 speciminum 112''' et 115'''.

Aanm. De aangehaalde afbeeldingen van RENARD en BLOCH laten veel te wenschen over. Die van RENARD is, even als

alle zijne afbeeldingen, uiterst slecht en slechts herkenbaar aan het algemeene der kleurtekening. Volgens de beschrijving van *Chaetodon bicolor* in de groote Histoire naturelle des Poissons zou de oogband bij het daar beschrevene specimen tot eene ronde vlek boven de oogen teruggebleven zijn en de staartvin afgeknot (coupée carrément). De blauwe dwarsche bandjes der schubben op het donkere gedeelte des ligchaams zijn bij mijne specimina zeer duidelijk.

Holacanthus melanosoma Blkr.

Holacanth. corpore oblongo compresso, diametro dorso-ventrali $2\frac{1}{2}$ ad $2\frac{1}{4}$ in longitudine corporis; capite obtuso $4\frac{2}{3}$ circiter in longitudine corporis; linea rostro-frontali valde declivi rectiuscula; linea rostro-dorsali linea rostro-ventrali breviore; oculis diametro $3\frac{1}{3}$ circiter in longitudine capitidis; osse suborbitali oculi diametro humiliore denticulis nullis conspicuis; praeoperculo margino posteriore dentibus magnis acutis p. m. 16 serrato, margine inferiore edentulo, spina oculo non vel vix breviore; suboperculo interoperculoque edentulis; squamis lateribus 100 p. m. in serie longitudinali; pinna dorsali spinosa spinis 9 posterioribus longitudine subaequalibus, parte radiosa obtusa rotundata parte spinosa vix altiore corpore duplo circiter humiliore; pectoralibus obtusis 6, ventralibus acutis $4\frac{2}{3}$, caudali convexa $5\frac{1}{2}$ circiter in longitudine corporis; anali obtusa rotundata dorsali non humiliore; colore corpore nigro, capite ante aurantiaco rivulato et maculato; pinna caudali pulchre flava medio fascia lata transversa nigra margines pinnae non attingente; pinnis ceteris nigris, dorsali radiosa margine superiore, anali radiosa margine inferiore postice tantum pulchre flavis.

B. 6. D. 13/19. P. 2/15. V. 1/5. A. 3/18 vel 3/19. C. 17 et lat. brev.

Habit. Lawajong, in mari.

Longitudo speciminis unici 120'''.

Aanm. Deze soort is gemakkelijk herkenbaar aan haar volkomen zwart ongeklekt ligchaam, gele rug- en aarsvinranden, gele met eene bandvormige dwarsche zwarte vlek getekende staartvin, kleine schubben, lage stompe rug- en aarsvinnen, ongetand onderoogkuilsbeen. enz.

Holacanthus leucopleura Blkr.

Holac. corpore oblongo compresso, diametro dorso-ventrali $2\frac{1}{2}$ circiter in longitudine corporis; capite obtuso convexo 5 circiter in longitudine corporis; linea rostro-dorsali ore clauso ubique convexa linea rostro-ventrali paulo breviore; oculis diametro 3 ad $3\frac{1}{2}$ in longitudine capitidis; osse suborbitali oculi diametro paulo humiliore inferne dentibus 4 vel 5 conspicuis; praecirculo margine posteriore dentibus mediocribus 14 ad 18, margine inferiore dentibus 2 vel 3, spina oculi diametro non vel vix breviore; suboperculo denticulato; interoperculo edentulo; squamis lateribus 44 p. m. in serie longitudinali; pinna dorsali spinosa spina postica spinis ceteris longiore, parte radiosa angulata acutiuscula corpore duplo circiter humiliore; pectoralibus obtusis et ventralibus acutis radio 1° paulo producto $4\frac{1}{2}$ ad 5, caudali obtusa rotundata 5 ad 5 et paulo in longitudine corporis; anali angulata obtusa dorsali radiosa paulo humiliore; colore corpore pinnisque nigro; lateribus superne sub spina dorsi 10° circiter macula maxima elongata transversa alba; pinna ventrali postice aurantia; anali margine antico-inferiore coeruleo et late flavo limbata.

B. 6. D. 14/16 vel 14/17. P. 2/15. V. 1/5. A. 3/17 vel 3/18. C. 17 et lat. brev.

Habit. Lawajong, in mari.

Longitudo 2 speciminum 88''' et 106'''.

Aann. Deze soort is gemakkelijk herkenbaar aan haar zwart ligchaam, aan de groote langwerpige dwarsche witte rugvlek, van voren en beneden met geel- en blaauw gerande aarsvin, zwarte borst- en staartvinnen, groote schubben, niet verlengde straalachtige rug- en aarsvinnen, enz. *Holacanthus passer* (Voyage de la fregate La Venus, Poiss. tab. 6) heeft insgelijks eene parelkleurige langwerpige vlek over het ligchaam, doch deze begint ongeveer onder den 6ⁿ rugdoorn en eindigt nabij de buiklijn ongeveer midden tusschen buik- en aarsvin, terwijl er bovendien de straalachtige rug- en aarsvinnen in zeer spitse punten verlengd en geheel bruin en geel gerand zijn en de borst-, buik- en staartvinnen geel gekleurd.

SCOMBEROÏDEI.

Seriola tapeinometopon Blkr.

Seriol. corpore oblongo compresso, altitudine $3\frac{1}{2}$ circiter in ejus longitudine, latitudine $2\frac{1}{2}$ circiter in ejus altitudine; capite acuto $3\frac{2}{3}$ circiter in longitudine corporis, paulo longiore quam alto; oculis diametro 3 circiter in longitudine capitum; linea rostro-frontali declivi concaviuscula; fronte carinata; maxilla superiore maxilla inferiore paulo breviora sub pupilla desinente; operculis profunde incisis; dentibus maxillis serie externa seriebus internis paulo majoribus; dentibus vomerinis antice in thuram trigonam apice antrorum spectante, postice in vittam longitudinalem basin thurmae trigonae attingente collocatis; thurmis dentium palatinorum oblongis sulco glabro a dentibus vomerinis remotis; linea dorsali rotundata linea ventrali convexiore; squamis corpore minimis conspicuis; linea laterali antice leviter convexa; pinna dorsali spinosa dorsali radiosa plus duplo humiliore spinis mediis ceteris longioribus; dorsali radiosa antice angulata corpore duplo circiter humiliore, vix emarginata; pectoralibus obtusis rotundatis $6\frac{1}{2}$ circiter, ventralibus latis angulatis et caudali emarginata lobis acutiuscula rotundatis superiore longiore $5\frac{1}{2}$ circiter in longitudine corporis; spinis analibus bene conspicuis posteriore anteriore longiore; anali longitudine $1\frac{1}{2}$ circiter in longitudine dorsalis radiosae, antice angulata dorsali radiosa humiliore, vix emarginata; colore corpore superne flavoviridescente inferne margaritaceo; fascia oculo-dorsali nigricante pinnam dorsalem spinosam versus adscendente; corpore fasciis transversis 5 vel 6 griseo-fuscescentibus; pinnis pectoralibus, ventralibus caudalique aurantiacis, ventralibus fusco arenatis; pinnis ceteris fuscis, dorsali radiosa analique radiis margineque libero aurantiacis.

B. 7. D. 1 procumb. + 7 — 1/30 vel 1/31. P. 2/17. V. 1/5. A. 2 — 1/20 vel 1/21. C. 17 et lat. brev.

Habit. Lawajong, in mari.

Longitudo speciminis unici 55'''.

Aanm. Deze Seriola is kenbaar aan haren spitsen kop en min of meer hol profiel, stompe afgeronde borstvinnen, korte vormen des ligchaams, oog-rugband, getallen der vinstralen enz. Meerdere soorten uit de Europeesche en Amerikaansche zeeën hebben ook den oog-rugband, doch zij schijnen alle een bol profiel te hebben. Mijn specimen behoort waarschijnlijk tot den jeugdigen leeftijdstoestand.

BLENNIOIDEL.

Petroskirtes solorensis Blkr.

Petroskirt. corpore elongato compresso, altitudine $5\frac{1}{2}$ ad 6 in ejus longitudine; capite convexo 5 fere in longitudine corporis; altitudine capitinis $1\frac{1}{2}$, latitudine $1\frac{3}{4}$ circiter in ejus longitudine; linea rostro-frontali convexa; rostro vix ante os prominente; crista occipitali cirrisque nullis; oculis diametro $2\frac{1}{2}$ circiter in longitudine capitinis, minus diametro 1 distantibus; rictu sub oculi parte anteriore desinente; maxillis antice tantum dentatis, dentibus confertis, maxilla superiore p. m. 14 angularibus utroque latere 2 caninoïdeis, maxilla inferiore 18 p. m. angularibus utroque latere caninis canino exteriore maximo valde curvato; apertura branchiali rotundata oculo minore; cute laevi; linea laterali antice tantum conspicua; pinnis radiis omnibus simplicibus; dorsali paulo ante aperturam branchiale incipiente et prope basin pinnac caudalis desinente, margine superiore convexiuscula non emarginata corpore paulo minus duplo humiliore radio nullo producto; pectoralibus obtusis 6, ventralibus 8 circiter, caudali obtusa convexa 6 circiter in longitudine corporis; anali dorsali humiliore margine inferiore convexiuscula; corpore fusco-violaceo ventre flavo, fasciis 2 diffusis longitudinalibus coeruleis, fascia superiore frequenter subinterrupta ex maculis plus minusve distantibus composita; pinnis flavis, verticalibus, dorsali analique praesertim, fusco variegatis et maculatis.

B. 6. D. 30. P. 14. V. 3. A. 20. C. 11 et lat. brev.

Habit. Lawajong, in mari.

*Longitudo 2 speciminum 27''' et 30'''.

Aanm. Deze soort schijnt na verwant te zijn aan *Blennaechis grammistes* CV., maar verschilt er van, behalve door hare kleurtekening, door betrekkelijk korter kop, niet voor de bovenkaak uitstekende onderkaak enz.

Opistognathus solorensis Blkr.

Opistogn. corpore elongato compresso, altitudine $6\frac{1}{2}$ circiter in ejus longitudine, latitudine $1\frac{1}{2}$ circiter in ejus altitudine; capite convexo 4 et paulo in longitudine corporis duplo circiter longiore quam alto; oculis diametro 4 circiter in longitudine capitinis, minus diametro $\frac{1}{2}$ distantibus; linea rostro-frontali convexa; rostro obtuso convexo oculo multo breviore; maxilla superiore, inferiore paulo longiore, postice producto rotundato limbum praepercularem subattingente, parte postoculari parte

anteriori longiore; rictu maxime post oculos producto; dentibus maxillaris pluriseriatis serie externa conicis ceteris majoribus; fronte rugosa; capite, nucha ventreque ante pinnas ventrales alepidotis; squamis lateribus 65 p. m. in serie longitudinali; linea laterali supra anteriorem quartam partem pinnae analis desinente; pinnis dorsali et anali corpore humilioribus postice rotundatis; pectoralibus obtusis rotundatis 2 circiter, ventralibus acutis $1\frac{1}{2}$ circiter in longitudine capitis; caudali obtusa rotundata 6 et paulo in longitudine corporis; colore corpore fusco; capite dorsoque antice margaritaceo-coeruleo punctulatis; maxilla superiore postice macula duplice flava et nigra; pectoralibus aurantiacis; pinnis ceteris viridifuscescentibus, verticalibus margitaceo punctatis et radiis fusco variegatis, dorsali basi antice maculis 2 magnis nigris margaritaceo limbatis.

B. 6. D. 11/14 vel 11/15. P. 2/16. V. 1/5. A. 2/14 vel 2/15. C. 22
lat. brev. inclus.

Habit. Lawajong, in mari.

Longitudo speciminis unici 83'''.

Aanm. Deze soort staat in verwantschap tusschen *Opistognathus Sonneratii* CV. en *Opistognathus Cuvierii* CV. Zij is kenbaar aan de verlenging harer bovenkaak tot aan den achterrand des voorkieuwdeksels, aan hare betrekkelijk groote schubben, waarvan er ongeveer 65 op eene overlangsche rei gaan, aan de zwarte vlekken voor aan den grond der rugvin, enz.

GOBIOÏDEI.

Gobius quinquestrigatus CV. Poiss. XII p. 101. Blkr. Verh. Bat. Gen. XXII Gobioïd. p. 29.

Gob. corpore oblongo compresso altitudine 3 ad $3\frac{1}{3}$ in ejus longitudine, latitudine 3 circiter in ejus altitudine; capite obtuso convexo $4\frac{1}{4}$ ad $4\frac{1}{2}$ in longitudine corporis, aequo alto circiter ac longo; latitudine capitis 2 circiter in ejus longitudine; fronte glabra; oculis diametro 4 circiter in longitudine capitis, diametro 1 et paulo distantibus, in anteriore dimidio capitis sitis; rostro obtuso convexo oculo vix breviore; rictu valde obliquo, curvato; maxilla superiore inferiore paulo breviore sub oculo desinente; dentibus intermaxillaribus externis conicis dentibus inframaxillaribus majoribus; maxilla inferiore caninis 2 ad 4 magnis symphysi approximatis; sulco oculo-operculari conspicuo; appendice anali conica acuta; squamis corpore inconspicuis; pinnis dorsalibus approximatis, ob-

tus, spinosa radiosa humiliore, radiosa corpore duplo circiter humiliore rotundata; pectoralibus obtusis rotundatis $4\frac{1}{2}$ ad $5\frac{1}{2}$, caudali obtusa rotundata 5 circiter in longitudine corporis; ventrali pectorali multo breviore; colore corpore pinnisque pulchre flavo; capite regioneque thoracica vittis 5 transversis carmosinatis, vitta anteriore oculo-postmaxillari, 2^a et 3^a opercularibus, 4^a postbranchiali, 5^a basi pinnae pectoralis; corpore guttis carmosinatis in series 7 p. m. longitudinales dispositis; pinnis verticalibus violaceo leviter marginatis, interdum fuscouscentibus.

B. 4. D. 6 — 1/10 vel 6 — 1/11. P. 19 ad 21. V. 1/5. A. 1/9 vel 1/10. C. 30 p. m. (lat. brev. inclus.).

Synon. *Gobie à cinq traits* CV. Poiss. XII p. 101.

Habit. Lawajong, et Bima, Sumbawae insulae, in mari.

Longitudo 5 speciminum 28''' ad 38'''.

Aanm. Deze bijzonder fraaije soort, het eerst bij Tongatabou gevonden en mij later van het eiland Sumbawa geworden, is op de beide bovenaangehaalde plaatsen onvolledig beschreven wat de kleuren aangaat. Mijne specimina van Lawajong bevinden zich in uitmuntenden toestand van bewaring en leeren mij dat, behalve de vijf dwarsche karmozijn-roode bandjes van kop en borst, het ligchaam geteekend is met ongeveer 7 overlangssche reijen van fraaije karmozijn-roode ronde vlekjes.

LOPHIOÏDEI.

Antennarius horridus Blkr.

Antenn. corpore ovali compresso, altitudine $1\frac{1}{2}$ circiter in ejus longitudine, latitudine $2\frac{1}{2}$ circiter in ejus altitudine, ventre valde prominente; oculis (cornea) diametro $4\frac{1}{2}$ circiter in longitudine maxillae superioris; rictu subverticali postrorsum descendente; dentibus maxillis acutis, conicis, mediocribus, maxilla superiore antice quadrilateratis postice uniseriatis, maxilla inferiore antice quadrilateratis postice bi- vel triseriatis; dentibus vomero-palatinis acutis mediocribus triseriatis in thurmas 4 oblongas collocatis, thurmis spatio glabro a se invicem remotis; apertura branchiali rotunda oculi diametro majore; cute corpore pinnisque spinulis confertissimis scabra; fimbriis conspicuis nullis; capite et dorso granulis osseis spinulosis sparsis, parcis, vertice seriatis; radio rostro libero gracilimo maxilla superiore longiore apice clavato membranaceo non fimbriato; pinna dorsali spinosa spinis cute spinulosa tectis non fimbriatis, spina

1^a libera obtusa maxilla superiore duplo breviore, spina 2^a spina 1^a duplo circiter longiore cute tegente obtusissima; dorsali radios et anali altitudine subaequalibus corpore quadruplo circiter humilioribus obtusis, dorsali anali duplo circiter longiore; pectoralibus et ventralibus digitatis maxilla superiore multo brevioribus; caudali flabelliformi $4\frac{1}{2}$ circiter in longitudine corporis; colore corpore superne nigricante-fusco inferne pinnisque fusco; radio rostro libero fusco et flavo annulato parte clavata flavescente; lingua nigra maculis flavis variegata; vitta transversa flava a radio dorsali 1^o opercula versus descendente inferne lata retiformi; regione supraäxillari macula rotunda lutea; ventre pinnisque verticalibus maculis rotundis magnis parcis nigris rubro-fusco cinctis; dorso caudae fascia transversa lutea; apicibus radiorum pectoralium et ventralium luteis; caudali angulum superiorem versus macula parva lutea.

B. 6. D. 1 fil. lib. + 2 — 10 simpl. 2 fiss. P. 10 simpl. V. 6 simpl. A. 7 fiss. C. 9 fiss.

Habit. Lawajong, in mari.

Longitudo speciminis unici 135.

Aanm. Deze soort is zoo na verwant aan *Chironectes Commersonii* CV. (Poiss. XII p. 318) dat ik aarzelde haar als eene eigene species voor te stellen. In de beschrijving van *Chironectes Commersonii* CV. wordt echter melding gemaakt noch van den gelen rug- operkelband, noch van den gelen staart en staartvinylekken, noch van de ronde met roodbruin geringde zwarte vlekken van buik en vinnen, welke donkere vlekken echter op de donkere kleur van ligchaam en vinnen zoo weinig afsteken, dat ze der waarneming ligtelijk ontglippen. Ik acht eene vergelijking van goed bewaarde specimina van *Chironectes Commersonii* CV. met bovenstaande beschrijving van mijn specimen wenschelijk, om tot eene zekerheid te geraken betreffende hun soortelijk verschil of gelijkheid.

Antennarius nesogallicus Cuv. Règn. anim. II p. 251. Guér.
Iconogr. R. anim. Poiss. tab. 41 fig. 2.

Antenn. corpore ovali compresso, altitudine 2 ad 2 et paulo in ejus longitudine, latitudine $2\frac{1}{2}$ ad 3 in ejus altitudine; oculis diametro 3 ad 4 in longitudine maxillae superioris; rictu subverticali postrorum descendente; dentibus maxillis acutis conicis mediocribus, maxilla superiore u-

niseriatis, maxilla inferiore antice biseriatis postice uniseriatis; dentibus vomero-palatinis acutis mediocribus uniseriatis parcis seribus brevibus spatio glabro a se invicem remotis; apertura branchiali rotunda oculo majore; cute corpore pinnisque squamis minimis conspicuis; fimbriis angulo oris vertice et dorso parciissimis ventre crebrioribus, plurimis oculo longioribus; granulis osseis capite dorsoque nullis; radio rostro libero gracillimo spina 1^a breviore apice clavato fimbriato; pinna dorsali spinosa cute squamuosa tecta, spinis fimbriosis 1^a obtusa maxilla superiore duplo circiter breviore, 2^a 1^a multo longiore maxilla superiore paulo breviore; dorsali radiosa et anali obtusis altitudine subaequalibus corpore duplo circiter humilioribus, dorsali anali plus duplo longiore; pectoralibus et ventralibus digitatis, ventralibus 5, caudali obtusa convexa 4 ad 3½ in longitudine corporis; colore corpore superne pinnisque olivaceo-fusco, inferne aurantiaco; corpore punctis crebris albis; dorso nebulis fuscis profundioribus et maculis parcis griseo-coeruleis; lingua parce fusco maculata; radio rostro libero flavescente; ventre maculis fuscis et guttulis luteis; pinnis luteo vel flavo parce maculatis, dorsali radiosa et anali nigricante oblique subfasciatis; caudali fasciis 3 vel 4 transversis nigricantibus.

B. 6. D. 1 fil. lib. + 2 — 10 simp. 2 fiss. P. 10 simpl. V. 5 simpl. A. 2 simpl. 5 fiss. vel 1 simpl. 6 fiss. C. 1/7/1 vel 1/5/3.

Synon. *Chironectes nesogallicus* CV. Poiss. XII p. 299.

Chironecte de l' Isle de France CV. ibid.

Habit. Lawajong, in mari.

Longitudo 3 speciminum 38''' ad 52'''.

Aanm. Mijne specimina beantwoorden zeer goed aan de aangehaalde beschrijving en afbeelding. Deze afbeelding laat echter te wenschen over, ontbrekende er talrijke huiddraden, de vrije snuitdraad, de fimbriën der rugdoornen, enz.

LABROÏDEI CTENOÏDEI.

Pomacentrus pavoninus Blkr.

Pomacentr. corpore oblongo compresso, altitudine 3½ circiter in ejus longitudine, latitudine 2 et paulo in ejus altitudine; capite obtuso convexo 4 circiter in longitudine corporis, aequo alto circiter ac longo; oculis diametro 2½ circiter in longitudine capitis; linea rostro-frontali convexa; osse suborbitali sub oculo oculi diametro plus triplo humiliore, non emarginato, edentulo; dentibus maxillis obtusis maxilla superiore p. m. 30, maxilla inferiore p. m. 24; praoperculo subrectangulo angulo rotun-

dato, margine posteriore dentibus parvis conspicuis; operculo postice spinula plana; linea laterali sub anteriore dimidio pinnae dorsalis radiosae interrupta; squamis lateribus 29 p. m. in serie longitudinali; pinna dorsali spinosa spina postica spinis ceteris longiore, membrana interspinali parum emarginata lobata; dorsali radiosa rotundata parte spinosa altiore; pectoralibus obtusis 4 et paulo, ventralibus acutis radio 1° producto et caudali leviter emarginata lobis obtusis rotundatis $4\frac{1}{2}$ circiter in longitudine corporis; anali postice acutangula rotundata; capite, dorso lateribusque superne usque sub media pinna dorsali radiosa coeruleis, ventre lateribus inferne, dorso postice caudaque pulchre flavis; squamis parte corporis coerulea plurimis marginem liberum versus vittula transversa fusca, parte corporis flava plurimis basi guttula dilute coerulea; operculo superne puncto nigricante; pinna dorsali usque medianam partem radiosam analique maxima parte violaceis postice flavis, parte violacea superne vitta longitudinali dilute coerulea; squamis coeruleo dilutiore guttulatis; pinnis ceteris pulchre flavis, pectoralibus basi superne macula parva fusca.

B. 5. D. 13/14 vel 13/15. P. 2/16. V. 1/5. A. 2/14 vel 2/15. C. 16
et lat. brev.

Habit. Lawajong, in mari.

Longitudo speciminis unici 51'''.

Aanm. Deze soort heeft zoo groote verwantschap met *Pomacentrus pavo* Lacép., dat men haar ligtelijk als eene varieiteit daarvan zou kunnen beschouwen. De scherpe afscheiding van de gele kleur des lichaams van de blaauwe doet haar gemakkelijk herkennen, doch ik beschouw haar als eenig eigene soort, voornamelijk op grond van hare weinig uitgerande stomp- en rondkwabbige staartvin, welke bij exemplaren van dezelfde grootte van *Pomacentrus pavo* Lacép. reeds zeer spitse kwabben vertoont.

LABROÏDEI CYCLOÏDEI.

Julis (Halichoeres) solorensis Blkr.

Jul. (Halichoer.) corpore oblongo compresso, altitudine $4\frac{2}{3}$ circiter in ejus longitudine, latitudine 2 circiter in ejus altitudine; capite aento convexo $4\frac{1}{2}$ circiter in longitudine corporis; altitudine capitidis $1\frac{2}{3}$ circiter in ejus longitudine; oculis diametro $4\frac{1}{3}$ in longitudine capitidis; linea rostro-frontali rostro convexa; rostro aento oculo non breviore; dentibus maxillaris conicis mediocribus anticis 2 caninis mediocribus curvatis; dente an-

gulo oris mediocri prominente; squamis nuchalibus et thoracicis squamis ceteris multo minoribus, lateribus 26 p. m. in serie longitudinali; linea laterali ramosa; pinnis dorsali et anali basi glabris, dorsali spina postica spinis ceteris longiore, dorsali radiosa dorsali spinosa altiore postice obtusa; pectoralibus obtusis et ventralibus acutis 6 circiter, caudali obtusa convexa $5\frac{1}{2}$ circiter in longitudine corporis; anali postice obtusa angulata; colore corpore superne violascente-olivaceo basi squamarum profundiore, inferne flavo; labiis flaviis, operculis genisque vittis longitudinalibus rubro-violaceis; pinnis verticalibus aurantiaco-rubris; dorsali antice pulchre flava rubro marginata, macula angulata nigra spinam 1^m inter et 3^m, dorsali radiosa dimidio basali macula profunda rubro cineta radium 5^m inter et 6^m; pectoralibus roseis basi flavis et vitta transversa profunde coerulea; anali rubro diffuse maculata fusco marginata; caudali basi superne macula parva nigra vel profunde coerulea.

B. 6. D. 9/12 vel 9/13. P. 2/12 vel 2/13. V. 1/5. A. 3/12 vel 3/13.

C. 14 et lat. brev.

Habit. Lawajong, in mari.

Longitudo speciminis unici 94''.

Aanm. De kleuren van mijn specimen hebben door den wijngest geleden, doch zijn in het algemeen nog goed herkenbaar; slechts zijn de teedere schakeringen van rug- en aarsvin en de bandtekening des kops niet duidelijk herkenbaar. De soort is herkenbaar aan de afwezigheid van bandtekening op ligchaam en de oranjeroode vertikale vinnen, aan de donkere vlekken op rug- en staartvin, slank ligchaam, groote schubben, getakte zijlijn enz.

Julis (Halichoeres) melanurus Blkr.

Varietas. *cyanuropterus*. Pinna caudali coerulea, postice fascia lata semilunari nigra et vittis 2 carmosinis semilunariibus fasciam nigram intrantibus, basi maculis oblongis carmosinis et flavis.

Habit. Lawajong, in mari,

Julis (Halichoeres) miniatus K. v. H.

Variet. a. Pinna anali vittis obliquis rubro-violaceis vel carmosinis.

b. Pinna anali punctis violaceis in series 4 longitudinales dispositis.

Habit. Lawajong, in mari.

Cirrhilabrus solorensis Blkr.

Cirrhilab. corpore oblongo compresso, altitudine 4 circiter in ejus longitudine, latitudine 2 et paulo in ejus altitudine; capite convexiusculo $4\frac{1}{2}$ circiter in longitudine corporis, paulo longiore quam alto; oculis diametro $3\frac{1}{2}$ circiter in longitudine capitis; linea rostro-frontali rōstro convexiuscula; maxillis aequalibus superiore ante oculum desinente; dentibus maxillaris, caninis exceptis, parvis numerosis, maxilla superiore antice caninis 6 mediis 2 parvis externis 4 magnis extrorsum curvatis, maxilla inferiore antice caninis 2 mediocribus rectiusculis; vertice, genis operculisque squamis magnis tectis; praecirculo rotundato denticulis parvis conspicuis; linea dorsali linea ventrali paulo convextiore; linea laterali singulis squamis tubulo simplice notata sub pinnae dorsalis radiosae parte posteriore interrupta; squamis parte libera longitudinaliter valde striatis, lateribus 24 p. m. in serie longitudinali, 7 vel 8 in serie transversali; squama interventrali longissima; pinnis verticalibus basi squamosis; dorsali spinosa spina postica spinis ceteris longiore, membrana vix emarginata; dorsali radiosae dorsali spinosa paulo altiore postice angulata; pectoralibus obtusis 6, ventralibus radio 2° valde producto $4\frac{1}{2}$ circiter, caudali obtusa convexa 5 fere in longitudine corporis; anali postice angulata; colore corpore rubro-violaceo; mediis lateribus sub pinnae dorsalis spinosae dimidio posteriore maculis aliquot parvis profunde violaceis; dentibus coeruleis; pinnis verticalibus spinis et radiis coeruleis; dorsali membrana carmosina parte spinosa antice vittulis curvatis rubro-violaceis, parte radiosae superne flavo et rubro-violaceo variegata; pectoralibus roseis basi flavis; ventralibus roseis radiis rubro-violaceis; anali membrana basi carmosina dimidio libero aurantiaca vittula longitudinali rosea; caudali membrana aurantiaca vittulis 5 p. m. undulatis transversis violaceo-roseis.

B. 5. D. 11/9 vel 11/10. P. 2/13. V. 1/5. A. 3/9 vel 3/10. C. 13 et lat. brev.

Habit. Lawajong, in mari.

Longitudo speciminis unici 78'''.

Aanm. In den tweeden jaargang van het Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch Indië, bladz. 71, stelde ik een geslacht van Gladshubbige Lipvissen op, hetwelk ik naar zijne overeenkomst met *Cheilinus*, *Cheilinoïdes* noemde. Dit geslacht evenwel is geen ander als *Cirrhilabrus* T. Schleg. beschreven in de Fauna japonica, welke laatste naam behouden moet worden als eerder voorgesteld dan *Cheilinoïdes*.

Tot nu toe zijn mij drie soorten van *Cirrhilabrus* bekend t.

w. de Japansche soort, door de heeren TEMMINCK en SCHLEGEL zonder naam gelaten, welke ik in mijne Nalezingen op de ichthyologische fauna van Japan (Verh. Batav. Genootsch. XXV) *Cirrhilabrus Temminckii* heb genoemd; — voorts *Cirrhilabrus cyanopleura* Blkr. (*Cheilinoëdes cyanopleura* Blkr. olim) van Batavia en de bovenbeschrevene.

Cirrhilabrus solorensis heeft meer van de Japansche dan van de Bataviatische soort, en is voornamelijk herkenbaar aan hare paarse kleur, afwezigheid van bandtekening op het ligchaam en matige verlenging van den tweeden buikvinstraal, die slechts tot aan het begin der aarsvin reikt.

ESOCES.

Hemiramphus fasciatus Blkr.

Hemiramph. corpore elongato compresso, altitudine 11 circiter in ejus longitudine, latitudine $1\frac{1}{2}$ circiter in ejus altitudine; capite 3, rostro $4\frac{3}{4}$ circiter in longitudine corporis; maxilla superiore obtusa, latiore quam longa, brevissima; membrana inframaxillari valde conspicua rotundata; oculis diametro $1\frac{1}{2}$ fere in capitis parte postoculari, minus diametro 1 distantibus; vertice plano; dentibus maxillis minimis aequalibus; dorso lateraliter rotundato; squamis peripheria striis numerosis concentricis centro reticulatis, lateribus 50 p. m. in serie longitudinali; linea laterali ventrali conspicua cauda prope basin pinnae caudalis desinente; pinna dorsali radio 1° ante pinnam analem inserta antice humili posse angulata elevata corpore non humiliore; pectoralibus capitisi parte postoculari multo longioribus; ventralibus postice in 4^a sexta corporis parte sitis, acutiusculis; anali longitudine $1\frac{1}{2}$ circiter in longitudine pinnae dorsalis, radiis anticis et posticis radiis mediis longioribus radiis dorsalibus posticis brevioribus; caudali emarginata, lobis acute rotundatis inferiore longiore 7 circiter in longitudine corporis; colore corpore superne viridi marginibus squamarum fusco inferne argenteo; fasciis corpore fuscescentibus transversis latis diffusis 9 vel 10; membrana inframaxillari nigra; pinnis pectoralibus, ventralibus et anali flavescentibus; dorsali antice flavescente postice nigra; caudali lobo superiore rubra, parte centrali nigra, lobo inferiore violacea.

B. 11? D. 13. P. 1/9. V. 1/5. A. 2/10. C. 15 et lat. brev.

Habit. Lawajong, in mari.

Longitudo speciminis unici 64'''.

Aann. Deze soort behoort tot de groep van *Hemiramphus Commersonii* CV. en is aan deze laatste na verwant. Zij is gemakkelijk herkenbaar aan hare dwarsche ligchaamsbanden, aan de betrekkelijke lengte van de onderkaak, aan de zeer korte stompe bovenkaak, aan de verhouding der lengte van rug- en aarsvinnen enz.

PLEURONECTEOÏDEI.

Synaptura marmorata Blkr.

Synapt. corpore oblongo, altitudine $2\frac{1}{2}$ circiter in ejus longitudine; capite obtuso rotundato 5 circiter in longitudine corporis, altiore quam longo; oculis dextris, minus diametro 1 approximatis, superiore ante inferiorem prominente diametro 7 ad 8 in longitudine capitidis; rostro fimbriato ante os prominente; ore subantico rictu curvato sub oculo inferiore desinente; labiis mentoque fimbriatis; dentibus maxillis latere sinistro tantum, setaceis pluriseriatis in thurmas angulatas collocatis; linea laterali recta lineae dorsali plus quam lineae ventrali approximata; squamis ciliatis, lateribus 100 p. m. in serie longitudinali usque ad aperturam branchialem; pinnis dorsali, caudali et anali totis unitis radiis fissis; dorsali rostro ante oculum superiorem incipiente anali non altiore altitudine 3 et paulo in altitudine corporis; caudali obtusa rotundata; pectorali dextro latere 4 sinistro latere 5 circiter in longitudine capitidis; ventralibus obtusis dextra sinistra longiore basi cum anali unita; latere oculari violaceo-ferreo griseo-coeruleo marmorato et maculato; marginibus pinnarum luteis; latere anophthalmo albido margines pinnarum versus nigricante.

B. 6. D. 64. C. 14. A. 50. P. 7 vel 8. V. d. 5, sin. 4.

Habit. Lawajong, in mari.

Longitudo speciminis unici 139'''.

Aann. Ik kan deze soort tot geene der mij bekende terugbrengen. Zij is kenbaar aan haar met lichtblaauw overal gemarmerd violet-ijzerkleurig ligchaam, korte vormen, hooge vertikale vinnen, betrekkelijk gering aantal vinstralen, enz.

GYMNODONTES.

Tetraödon meleagris Soland. MSS., Lacép. Poiss. I p. 505. Bl. Schn. Syst. posth. p. 507. Richards. Zoölog. of the Voyage of the Sulphur p. 122 tab. 56 fig. 1-3.

Tetraöd. corpore oblongo, altiore quam lato, altitudine $3\frac{1}{2}$ circiter in ejus longitudine, ventre tamen aëre repleto maxime extenso; capite 3 circiter in longitudine corporis; linea rostro-dorsali ante oculos concava; oculis superis diametro 6 fere in longitudine capitis, diametris plus quam 2 distantibus; papillis nasalibus utroque latere 2 oblongis basi unitis; maxilla superiore ante inferiorem prominente; capite corporeque spinulis scabris, labiis, basibus pinnarum caudaque postice tantum laevibus; linea laterali inconspicua; pinnis obtusis rotundatis, dorsali et anali altioribus quam basi longis, caudali $5\frac{1}{2}$ circiter in longitudine corporis; colore corpore superne fusco-violaceo, lateribus violaceo, ventre pulchre aurantiaco-flavo, toto nigro et fusco regulariter reticulato, cellulis retis plurimis magnitudine oculum subacquantibus; pinnis pectoralibus, dorsali analique aurantiaco-flavis basi viridi-nigricantibus, caudali radiis profunde olivacea, membrana aurantiaca, nigricante reticulata.

D. 1/10. P. 1/17. A. 1/11. C. 1/7/1.

Synon. *Ehooë* Otaitens.

Habit. Lawajong, in mari.

Longitudo speciminis descripti 116'''.

Aanm. Deze soort is zeer goed afgebeeld in de Zoölogic der reis van de Sulphur. Mijn specimen, een twintigtal millimeters kleiner dan de afbeelding van den heer RICHARDSON, heeft de achterste helft van den staart glad en mist de vlektekening op rug- en aarsvin, doch beantwoordt er overigens volkomen aan. De formule der vinstralen van den heer RICHARDSON = D. 11. P. 19. A. 11. C. 9, beantwoordt insgelijks vrij goed aan de boven opgegevene. Ik bezit nog een specimen van *Tetraödon meleagris*, insgelijks van Lawajong, van slechts 13''' lengte, hetwelk volkomen dezelfde rangschikking der kleuren aanbiedt als het beschrevene.

Diodon orbicularis Bl. Ausl. Fisch. I p. 73 tab. 127.

Diod. corpore oblongo subquadrilatero, depresso, latiore quam alto, latitudine $2\frac{1}{2}$ circiter in ejus longitudine; capite quadrilatero, obtuso, depresso, longitudine $3\frac{1}{2}$ circiter in longitudine corporis; lineis interoculari et rostro-frontali concavis; oculis subposterioris diametro $3\frac{1}{2}$ circiter in longitudine capitis, diametris $2\frac{1}{2}$ circiter distantibus; cute supraorbitali cirro nullo; papilla utroque latere oblonga obtusa loco narium; mento papillis nullis; spinis capite totoque corpore crassis conicis longis acutis, membrana libera nulla, singulis radicibus 3 spina ipsa vulgo longioribus, radice 1 antrorum spectante; rostro, pinnarum radicibus caudaque postice glabris; spinis inter oculos serie antica 5, serie 2* 4, serie 3* vertice 4, orbitae parte inferiore 3, serie longitudinali a rostro usque ad caudam 8 ad 11, serie transversali inter pinnas pectorales 4 vel 5; pinnis dorsali, anali et pectoralibus flabelliformibus rotundatis, caudali obtusa rotundata 5 circiter in longitudine corporis; colore corpore violaceo-fusco antice dilutiore, ventre basibus spinarum flavescente, dorso lateribusque aliquot rotundis nigricantibus; pinnis viridis radiis fuscescente variegatis.

D. 1/10. P. 1/18. A. 1/9. C. 1/7/1.

Synon. *Zee Egel* Nieuh. Ged. Zee- en Lantr. p. 275 fig.

Schachkugel Bl. Ausl. Fisch. tab. 127.

Orbe-hérisson Bl. ibid.

Prickly Bottlefish Bl. ibid.

Diodon nicthererus Cuv. Sur les Diodons, in Mém. Mus. Hist.

Nat. IV. p. 135?

Diodon noir et blaise Cuv. ibid.

Diodon triedricus Cant. Catal. Mal. Fish. p. 371 (nec Cuv.).

Habit. Lawajong, in mari.

Longitudo speciminis unici 133'''.

Aanm. *Diodon orbicularis* Bl. is door CUVIER ten onregte tot zijne *Diodon tigrinus* gebragt en eene eigene soort, welke in het groote werk van BLOCH tamelijk goed is afgebeeld, en mijns inziens door CUVIER afzonderlijk beschreven onder den naam van *Diodon nicthererus* en door den heer CANTOR onder dien van *Diodon triedricus* Cuv.

De soort is zoo na verwant aan *Diodon nicthererus* Cuv. (Mém. Mus. Hist. Nat. IV p. 135 tab. 7 fig. 5) dat ik geen' grond vind om er haar van af te scheiden. De beschrijving van CUVIER is echter zeer kort, en de opgave der kleuren wijkt

van die van mijn specimen eenigzins af, doch de kleuren van het door CUVIER waargenomen specimen waren misschien grootendeels vergaan. De habitus der afbeelding van CUVIER beantwoordt volkomen aan dien van mijn voorwerp.

De heer CANTOR heeft deze soort beschreven onder den naam van *Diodon triedricus* Cuv. (Catal. Mal. Fish. p. 371), doch CUVIER zegt van zijne *Diodon triedricus* en de afbeelding er van in SEBA's Thesaurus (III tab. 23 fig. 4) toont duidelijk aan, dat de doornen er even talrijk zijn als bij *Diodon punctatus* en op ongeveer dezelfde wijze gerangschikt. De beschrijving van het doornstelsel van den heer CANTOR past volkomen op dat van mijn voorwerp.

BALISTINI.

Balistes senticosus Richards. Zoöl. Voy. Samar. Fish. p. 23 tab. 9. fig. 5—8.

Balist. corpore oblongo compresso, altitudine 2 circiter in ejus longitudine, latitudine 3 fere in ejus altitudine; capite 3 ad $3\frac{1}{2}$ circiter in longitudine corporis, altiore quam longo; oculis diametro $2\frac{1}{2}$ ad 3 circiter in longitudine capitidis, 1 ad $1\frac{1}{2}$ circiter in longitudine rostri; vertice plano; orbitis prominentibus; linea rostro-frontali rostro concavuscula; rostro ante oculos sulco triangulari; labiis carnosis; dentibus utraque maxilla 8 apice emarginatis, mediis ceteris longioribus; apertura branchiali ad supremam basin pinnae pectoralis desinente; scutis spinosis spina centrali longiore, lateribus 42 p. m. in serie longitudinali usque ad aperturam branchialem; genis sulcis alepidotis nullis; cauda compressa spinis majoribus vel setis nullis, medio multo altiore quam lata; pinna dorsali spinosa spina 1^a rostro non breviore, crassa, obtusa, antice spinulis secura, membrana pinnam dorsalem radiosam non attingente; dorsali radiosa et anali obtusis rotundatis antice quam postice altioribus, corpore plus triplo humilioribus; pectoralibus flabelliformibus; pinna ventrali spina 1^a crassa valde dentata, spinis sequentibus 12 p. m. gracilibus conspicuis; caudali flabelliformi 6 et paulo in longitudine corporis; corpore aetate juvenili fuscescente vittulis longitudinalibus curvatis irregularibus nigricantibus et punctis margaritaceo-coeruleis sparsis, aetate proiectiore fere toto nigro-violaceo, vittis longitudinalibus fusca et punctis margaritaceis distantibus sparsis; pinna dorsali spinosa fusca; dorsali radiosa, anali caudalique nigro-violaceis ocellis dilutioribus

vel nullis marginem liberum versus aurantiacis; pectoralibus aurantiacis.

D. 3 — 2/21. P. 1/12 ad 1/14 A. 1/20. C. 1/10/1.

Habit. Lawajong, in mari.

Longitudo 4 speciminum 30''' ad 50'''.

Aanm. Mijne specimina beantwoorden zoo juist aan de beschrijving en afbeelding van den heer RICHARDSON, dat mij hunne identiteit met *Balistes senticosus* (uit de Chinesche zee) niet twijfelachtig is. Evenwel vertoont die afbeelding de rug- en aarsvin aannerkelijk hockiger en hooger, wat evenwel misschien slechts toe te schrijven is aan verschil in leeftijd, hebbende genoemde afbeelding van *Balistes senticosus* eene lengte van 95''. De heer RICHARDSON vermeldt niets van de parelkleurige stipjes, waarmede het ligchaam geteekend is, maar hij verzuimt ook niet te zeggen, dat de toestand van bewaring zinner specimina te wenschen overliet en hunne juiste kleur alzoo niet kon beschreven worden.

Balistes chrysospilos Blkr.

• *Balist. corpore oblongo compresso, altitudine 2 circiter in ejus longitudine, latitudine 3 circiter in ejus altitudine; capite 3½ circiter in longitudine corporis, altiore quam longo; oculis diametro 4 circiter in longitudine capitidis, plus quam 2 in longitudine rostri; vertice convexo; linea rostro-frontali ante oculos convexa, rostro convexiuscula; rostro ante oculos sulco subtriangulari; labiis carnosis; dentibus utraque maxilla 8, apice emarginatis, mediis ceteris longioribus; apertura branchiali ante basin pinnae pectoralis desinente; scutis granulatis lateribus 36 p. m. in serie longitudinali usque ad aperturam branchialem; genis sulcis longitudinalibus 4 vel 5 alepidotis glabris; cauda compressa spinis vel spinulis nullis, medio multo altiore quam lata; pinna dorsali spinosa spina 1° rostro breviore, crassa, obtusa, antice granulis scabra, membrana pinnam dorsalem radiosam non attingente; dorsali radiosae et anali obtusis rotundatis antice quam postice altioribus corpore minus triplo humilioribus; pectoralibus flabelliformibus; pinna ventrali spina 1° crassa dentata, spinis sequentibus 15 p. m. gracilibus conspicuis; caudali postice convexa angulis paulo prominentibus 5 circiter in longitudine corporis; colore corpore superne fusco-violaceo, inferne griseo-violaceo; toto corpore maculis rotundis confertis aureis ex parte in vittas longitudinales unitis; pinnis pectoralibus basi violaceis apicem versus flavis; pinnis ceteris violaceis,*

dorsali spinosa flavo nebulata, ceteris guttis aureis numerosis confertis.

D. 3 — 2/24. P. 1/12. A. 3/20. C. 1/10/1.

Habit. Lawajong, in mari.

Longitudo speciminis unici 135'''.

Aanm. Deze fraaije soort is gemakkelijk herkenbaar aan de goudkleurige vlekken, waarmede ligchaam en vertikale vinnen bedekt zijn.*

Monacanthus melanocephalus Blkr.

Monacanth. corpore oblongo compresso, diametro dorso-anali 3 circiter in longitudine corporis, latitudine $2\frac{1}{2}$ circiter in diametro dorso-anali; capite acuto $3\frac{1}{2}$ circiter in longitudine corporis, paulo altiore quam longo; oculis diametro $3\frac{1}{2}$ circiter in longitudine capitis; linea rostro-fron-tali valde concava; rostro acuto oculo plus duplo longiore; dentibus maxilla superiore 8, maxilla inferiore 6 angularibus obtusis ceteris obtusiusculis; apertura branchiali ante basin superiorem pinnae pectoralis desinente; squamis corpore parvis conspicuis, spiniferis, spinulis capite, dorso lateribusque antice brevibus oculo nudo vix conspicuis, lateribus postice utroque latere spinis 11 p. m. uniseriatis extrorsum et deorsum spectantibus armata, membrana humili spina nulla suffulta; pinnis radio produeto nullo; dorsali et anali radiosis obtusis rotundatis, altitudine subaequalibus, diametro dorso-anali minus quadruplo humilioribus, radiis omnibus simplicibus; pectoralibus obtusis convexis; ventrali trianguli squamis majoribus valde scabra, spina 1^o infra pinnam prominente postice et apice valde dentata, radiis apicibus conspicuis; caudali convexa obtusa $5\frac{1}{2}$ circiter in longitudine corporis; colore capite et dorso antice profunde fuscescente-nigro, regione thoracica fuso, corpore postice fuscescente-aurantiaco; fascia nucho-pectorali nigra; spina dorsi fusca; dorsali radiosae analique aurantiaco-rubris vittis 5 vel 6 longitudinalibus dilute violaceis; ventrali inferne pulchre aurantiaca vitta longitudinali curvata violacea, angulo inferiore violaceo guttulata; pectoralibus dilute violascenibus; caudali aurantiaco-rubra membrana dimidio basali ocellis luteis dimidio posteriore vittis 5 p. m. transversis violaceis.

D. 1 — 31. P. 12. A. 29. C. 1/10/1.

Habit. Lawajong, in mari.

Longitudo speciminis unici 90'''.

Aanm. Deze soort is gemakkelijk herkenbaar aan hare slanke vormen, spitsen kop, sterk getanden rugdoorn, geheel eigen-aardige kleurtekening van ligchaam en vinnen enz. De doornjes des ligchaams worden naar den staart toe allengskens lan-

ger en slanker en buigzaam, zoodat de achterste helft des lichaams als met borstels is bezet, welker punten min of meer naar voren omgebogen zijn.

OSTRACIONES.

Ostracion solorensis Blkr.

Ostrac. pyxide tetragona, altitudine maxima 3 et paulo in corporis longitudine, latitudine maxima altitudinem superante; dorso plano et ventre convexiusculo medio non carinatis; lateribus concavis; ventre dorso latiore; capite 4 circiter in longitudine corporis, vix longiore quam alto; linea rostro-frontali et linea interoculari concavis; oculis diametro $2\frac{1}{4}$ circiter in longitudine capitis, $1\frac{1}{2}$ ad $1\frac{1}{4}$ in altitudine rostri; ore ante rostrum prominente; labiis valde carnosis; dentibus maxillis obtusis subaequalibus, maxilla superiore 10, maxilla inferiore 8; apertura pyxidis anteriore ovali longitudine oculi diametrum subaequante; pyxide spinis nullis scutis hexagonis; pinnis dorsali et anali obtusis flabelliformibus; pectoralibus obtusis; caudali obtusa rotundata; colore corpore superne lateribusque fusco-violaceo, rostro, genis, ventre caudaque aurantiaco-flavo; lateribus superne vittis 3 undulatis longitudinalibus margaritaceo-coeruleis; lateribus mediis lineis margaritaceo-coeruleis reticulatis, lineis ventrem versus sensim flavescentibus; rostro, genis corporeque inferne guttis numerosis fuscis; cauda maculis magnis irregularibus confertis fusco-violaceis; pinnis dorsali et pectoralibus dilute violascentibus, anali viridescente-flava, caudali viridi-aurantiaca violaceo marginata dimidio basali fusco guttulata.

D. 1/8. P. 1/8. A. 1/8. C. 1/8/1.

Habit. Lawajong, in mari.

Longitudo speciminis unici 71'''.

Aann. Deze fraaije Ostracion behoort tot de groep van *Ostracion cubicus* Bl., *Ostracion argus* Rüpp., *Ostracion cyanurus* Rüpp., *Ostracion Selae* Blkr. enz.; dat is, tot die groep, bij welke het lichaam vierkant is en ongedoornd, de rug ongekield en de snuit niet uitpuilende. De soort onderscheidt zich van de haar verwante voornamelijk door eigenaardige kleurtekening, doordien het lichaam aan de buikvlakte breeder is dan zijne hoogte, door hol profiel, enz.